



Ayude a proteger a su bebé de la enfermedad neumocócica invasiva (ENI), que puede causar afecciones graves, con VAXNEUVANCE.

¿Qué es VAXNEUVANCE?

VAXNEUVANCE es una vacuna que ayuda a proteger contra la enfermedad invasiva causada por 15 tipos de neumococos, un tipo de bacteria, en individuos de 6 semanas de edad o más. La enfermedad invasiva es una forma grave de la enfermedad neumocócica.

Información de seguridad importante

VAXNEUVANCE podría no proteger a todas las personas que se vacunan.

Su hijo no debe recibir VAXNEUVANCE si es alérgico a alguno de los ingredientes de VAXNEUVANCE o al toxoide diftérico.

(La Información de seguridad importante continúa en la página 4).



Vaxneuvance®
Pneumococcal 15-valent
Conjugate Vaccine

Infórmese sobre la ENI

Quizás esta sea la primera vez que haya escuchado hablar de la enfermedad neumocócica invasiva (ENI). En esta guía, se ofrecen algunos datos **sobre la ENI e información sobre una vacuna que puede ayudar a proteger a su bebé.**



¿Qué es la ENI?

En la enfermedad neumocócica invasiva, el término “**invasiva**” significa que el **neumococo** ha ingresado en partes del cuerpo que normalmente están libres de gérmenes. Una persona sana o enferma puede transmitir el neumococo a otras personas al toser o estornudar.

¿Qué puede ocurrir si mi hijo contrae ENI?

La ENI puede provocar infecciones graves, como las siguientes:

- **meningitis neumocócica**, que es una infección grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal;
- **bacteriemia neumocócica**, que es una infección en la sangre.

Algunos signos y síntomas frecuentes

Meningitis:

- Fiebre
- Cefalea
- Cuello rígido
- Vómitos

Bacteriemia:

- Fiebre
- Escalofríos

En los bebés, estas infecciones pueden causar lo siguiente:

- Alimentación e hidratación deficientes
- Dormir más que lo usual
- Mayor irritabilidad

¿Qué riesgos presenta la ENI para mi bebé?

La ENI puede provocar problemas graves como los siguientes:



Hospitalización



Daño cerebral



Discapacidades a largo plazo



Si bien son poco frecuentes, algunas de estas infecciones pueden ser mortales. Por este motivo, es importante que su bebé siga recibiendo las vacunas para protegerse de la ENI.

¿Qué es VAXNEUVANCE y cómo ayuda a proteger a mi bebé de la ENI?

VAXNEUVANCE es una vacuna que ayuda a proteger contra algunos de los tipos más frecuentes de bacterias neumocócicas que pueden causar la ENI. La vacuna ayuda al sistema inmunitario del niño a combatir la bacteria.



Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Antes de que su hijo reciba VAXNEUVANCE, informe a su proveedor de atención médica si su hijo tiene o tuvo una reacción alérgica a alguna vacuna. También informe a su proveedor de atención médica si su hijo tiene un sistema inmunitario débil o si toma medicamentos o recibe tratamientos que podrían debilitar su sistema inmunitario. Informe a su proveedor de atención médica si su hija adolescente está embarazada o amamantando. Si su hijo es un lactante, informe a su proveedor de atención médica si su hijo nació antes de tiempo (prematuro).

(La Información de seguridad importante continúa en la página 5).

 **Vaxneuvance**[®]
Pneumococcal 15-valent
Conjugate Vaccine

¿Cuándo debería recibir mi hijo VAXNEUVANCE?

Los bebés y niños pequeños necesitan **4 dosis** de VAXNEUVANCE. Esto significa una dosis en las siguientes edades:



Asegúrese de que su hijo reciba VAXNEUVANCE lo antes posible

Las vacunas antineumocócicas existen desde hace muchos años y han contribuido a reducir el número de casos de ENI en niños estadounidenses. Si completa las 4 dosis de VAXNEUVANCE, podrá ayudar a brindarle a su bebé la protección que necesita contra la ENI.



Si mi hijo no ha recibido ninguna dosis pero ya tiene más de 2 meses, ¿es demasiado tarde para comenzar con VAXNEUVANCE? No, no es demasiado tarde, pero es muy importante ponerse al día. Hable con el proveedor de cuidados de la salud de su hijo hoy mismo.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Los efectos secundarios más frecuentes observados en niños menores de 2 años de edad son fiebre, dolor, enrojecimiento, hinchazón o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la inyección. Es posible que su hijo esté más irritable y somnoliento que de costumbre y que coma menos de lo habitual.

Los efectos secundarios más frecuentes observados en niños y adolescentes de 2 a 17 años de edad son dolor, hinchazón, enrojecimiento o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la inyección; dolores musculares; sensación de cansancio y dolor de cabeza.

(La Información de Seguridad Importante continúa en la página 6).

 **Vaxneuvance**[®]
Pneumococcal 15-valent
Conjugate Vaccine

¿Qué más debo saber sobre VAXNEUVANCE?

Tenemos respuestas para algunas de las preguntas frecuentes de padres y cuidadores.



¿Contiene VAXNEUVANCE algún conservante?

No. VAXNEUVANCE no contiene conservantes.



¿Puede mi bebé contraer ENI por la vacuna?

No. Su bebé no puede contraer ENI por recibir VAXNEUVANCE.



¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre el costo de VAXNEUVANCE?

Hable con su proveedor de seguro sobre el costo de las vacunas según su plan. El Plan de Seguro Médico para Niños (Children's Health Insurance Plan, CHIP) y el Programa de Vacunas para Niños (Vaccines for Children, VFC) pueden ofrecer vacunas a precios reducidos o gratuitas a los niños que reúnan los requisitos necesarios.



¿Puede mi hijo recibir VAXNEUVANCE al mismo tiempo que otras vacunas?


Sí. Su hijo puede recibir VAXNEUVANCE junto con otras vacunas.



El profesional de cuidados de la salud de su hijo está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre VAXNEUVANCE. Le alentamos a que se una a su esfuerzo por ayudar a proteger a su hijo de la ENI.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Después de recibir VAXNEUVANCE, informe a su proveedor de atención médica de inmediato si su hijo tiene síntomas de una reacción alérgica, que pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta, urticaria o erupción cutánea. También informe a su proveedor de atención médica si su hijo tiene algún efecto secundario que le moleste o si se presenta algún otro síntoma inusual.



¿Quién fabrica VAXNEUVANCE?

VAXNEUVANCE es fabricada por Merck. Merck lleva más de **130 años** fabricando vacunas para prevenir enfermedades.

La foto muestra a un actor.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

VAXNEUVANCE podría no proteger a todas las personas que se vacunan.

(La Información de Seguridad Importante continúa en la página 8).

 **Vaxneuvance**[®]
Pneumococcal 15-valent
Conjugate Vaccine

Cuidados del bebé después de la administración de VAXNEUVANCE

Su bebé acaba de recibir una dosis de VAXNEUVANCE. Es posible que el proveedor de atención médica de su hijo ya le haya informado sobre los efectos secundarios que puede experimentar el bebé después de la vacunación.



Información de Seguridad Importante (continuación)

Su hijo no debe recibir VAXNEUVANCE si es alérgico a alguno de los ingredientes de VAXNEUVANCE o al toxoide diftérico.

(La Información de Seguridad Importante continúa en la página 9).

 **Vaxneuvance**[®]
Pneumococcal 15-valent
Conjugate Vaccine

Qué puede esperar DESPUÉS de que su bebé reciba la vacuna

VAXNEUVANCE puede causar algunos efectos secundarios después de que los bebés reciben la vacuna. Estos efectos secundarios pueden durar alrededor de 3 días o menos. Además, es posible que haya otros efectos secundarios que no se enumeran a continuación.

Los bebés y los niños pequeños pueden experimentar lo siguiente:



Sentir dolor, tener hinchazón, enrojecimiento o un bulto en el lugar de la inyección



Estar más irritables de lo habitual



Tener fiebre



Sentirse más soñolientos de lo habitual



Comer menos de lo habitual



Para obtener más información sobre los efectos secundarios frecuentes de las vacunas y cómo puede ayudar a su bebé, visite [cdc.gov](https://www.cdc.gov) o hable con el proveedor de atención médica del bebé.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Antes de que su hijo reciba VAXNEUVANCE, informe a su proveedor de atención médica si su hijo tiene o tuvo una reacción alérgica a alguna vacuna. También informe a su proveedor de atención médica si su hijo tiene un sistema inmunitario débil o si toma medicamentos o recibe tratamientos que podrían debilitar su sistema inmunitario. Informe a su proveedor de atención médica si su hija adolescente está embarazada o amamantando. Si su hijo es un lactante, informe a su proveedor de atención médica si su hijo nació antes de tiempo (prematureo).

(La Información de Seguridad Importante continúa en la página 10).

El esquema de vacunación de su bebé es importante: aquí le mostramos cómo mantenerse al día

Complete los detalles a continuación.



2 meses	(MM/DD/AA)	Dosis 1	<input checked="" type="checkbox"/>
4 meses	(MM/DD/AA)	Dosis 2	<input type="checkbox"/>
6 meses	(MM/DD/AA)	Dosis 3	<input type="checkbox"/>
12-15 meses	(MM/DD/AA)	Dosis 4	<input type="checkbox"/>

Se recomienda que su bebé reciba la primera dosis de VAXNEUVANCE a los 2 meses, con tres dosis posteriores a los 4 meses, 6 meses, y entre los 12 y 15 meses de edad. VAXNEUVANCE es una parte del calendario de vacunación infantil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Los efectos secundarios más frecuentes observados en niños menores de 2 años de edad son fiebre, dolor, enrojecimiento, hinchazón o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la inyección. Es posible que su hijo esté más irritable y somnoliento que de costumbre y que coma menos de lo habitual.

(La Información de Seguridad Importante continúa en la página 11).

Cómo prepararse para la próxima dosis de VAXNEUVANCE de su bebé

Es posible que tenga preguntas más adelante. Si hay algo que quiera preguntarle al proveedor de atención médica de su bebé en la próxima visita, escríbalo a continuación.

NOTAS:



¿Qué debo hacer si mi hijo no recibe una dosis? Si su hijo no recibe una dosis de VAXNEUVANCE, puede preguntarle a su proveedor de atención médica cómo ponerse al día.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Los efectos secundarios más frecuentes observados en niños y adolescentes de 2 a 17 años de edad son dolor, hinchazón, enrojecimiento o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la inyección; dolores musculares; sensación de cansancio y dolor de cabeza.

Después de recibir VAXNEUVANCE, informe a su proveedor de atención médica de inmediato si su hijo tiene síntomas de una reacción alérgica, que pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta, urticaria o erupción cutánea. También informe a su proveedor de atención médica si su hijo tiene algún efecto secundario que le moleste o si se presenta algún otro síntoma inusual.

A photograph of a smiling family consisting of a man, a woman, and a baby. The man is in the background, smiling. The woman is in the foreground, holding the baby. The baby is looking towards the woman. The background is a bright, slightly blurred indoor setting.

Comience hoy mismo
con VAXNEUVANCE
para ayudar a
proteger a su bebé*
de la ENI: hable hoy
con su proveedor de
atención médica



* VAXNEUVANCE es para personas de 6 semanas de edad o más.

Información de seguridad importante

VAXNEUVANCE podría no proteger a todas las personas que se vacunan.

Su hijo no debe recibir VAXNEUVANCE si es alérgico a alguno de los ingredientes de VAXNEUVANCE o al toxoide diftérico.

Lea la [Información para el paciente](#) para VAXNEUVANCE que se adjunta y hable al respecto con su proveedor de atención médica. La [Información de prescripción](#) para médicos también está disponible.

